

## **Клещи проснулись**

### **Будьте внимательны и осторожны!**

С наступлением тепла и появлением первых проталин начинают проявлять свою активность иксодовые клещи.

Клещи нападают на человека не только в лесу, встретиться с ними вы можете и в городских парках и скверах, на садовых участках. Клещ может попасть в дом, притаившись в шерсти домашних животных или с букетом полевых цветов.



**Будьте бдительны, посещая лесные и парковые зоны, а также лесные массивы окрестностей населенных пунктов в весенне-летний сезон 2020 года.**



Таежный клещ



Клещ Павловский



Луговой клещ

На территории Томской области встречаются преимущественно таежный клещ и клещ Павловского. В последние годы возросла численность луговых клещей, которые массово регистрируются в более южных регионах Сибири (Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область).

## **Напоминаем жителям Томской области!!!**

Для предотвращения присасывания клещей соблюдайте меры профилактики:

- одежда должна быть с длинными рукавами, всегда заправляйте одежду в штаны, штаны заправляйте в носки или высокую обувь, обязательно надевайте головной убор;
- пользуйтесь репеллентными средствами акарицидного действия;
- проводите частые само- и взаимоосмотры (одежда, тело и волосы);
- нельзя садиться или ложиться на траву;
- стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности;
- не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;
- осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них клещей.



Сезон нападения клещей начинается в апреле и заканчивается в октябре.  
Наиболее активны клещи в начале лета. Пик их численности и активности  
приходится на май-июнь.

## Признаки заболевания

Первые признаки заболевания клещевыми инфекциями во многом схожи и могут проявиться через 1–40 и более дней. Если у Вас появились симптомы: высокая температура от 37.5 до 39.0 °C, слабость, головная боль и головокружение, тошнота, то нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено эффективное лечение, тем больше вероятность успеха в полном выздоровлении без перехода заболевания в хроническую форму и развития последующей инвалидности.

## Симптомы клещевого энцефалита



Головная боль



Тошнота



Слабость



Боль в суставах



Высокая температура

**ТОЛЬКО СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ,  
ВОВРЕМЯ СДЕЛАННАЯ ПРИВИВКА ПРЕДОХРАНЯТ ВАС  
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ!**

# Если укусил клещ

## 1. Срочно извлечь клеша

- обратитесь за помощью и консультацией в медицинскую организацию;
- если нет возможности обратиться за медицинской помощью, удалите клеша самостоятельно:



Нитка



Выкручиватель



Пинцет

- ранку обработать дезинфицирующим средством.

### При удалении клеша нельзя:



Касаться клеша  
незащищенными  
руками



Сдавливать  
клеша



Мазать мазями,  
масляными  
растворами,  
бензином и т.п.

## 2. Сдать на исследование клеша и кровь

- клеша сдают на исследование сразу после укуса;
- если клеш не подлежит исследованию, сдать кровь не ранее 24 часов после присасывания.



## 3. Профилактика

- при получении положительного результата исследования клеша или крови на вирус, будет введен противоклещевой иммуноглобулин.